

	• Sol. Natrii hydrocarbonas; • Sol. Dobutamină*; • Sol. Dopaminum;
--	--

E. INDICATORII DE MONITORIZARE A IMPLEMENTĂRII PROTOCOLULUI

Scopurile protocolului	Evaluarea atingerii scopului	Metoda de calculare a indicatorului	
		Numărător	Numitor
1. Identificarea pacienților la risc pentru MSC și stratificarea riscului de deces subit.	Scăderea numărului de MSC la pacienții cu risc de deces subit.	Numărul pacienților ce au decedat subit din pacienții aflați la risc pentru MSC X 100.	Numărul total al pacienților apreciați a fi la risc pentru MSC pe parcursul ultimului an.
2. Prevenția secundară a MSC prin implantarea defibrilatorului cardiac	Creșterea numărului implantărilor defibrilatorului cardiac pentru prevenția secundară a MSC	Numărul pacienților cărora li s-a implantat defibrilatorul cardiac pentru prevenția secundară a MSC X 100.	Numărul pacienților care necesită implantul defibrilatorului cardiac pentru prevenția secundară a MSC pe parcursul ultimului an.
3. Prevenția primară a MSC prin implantarea defibrilatorului cardiac	Creșterea numărului implantărilor defibrilatorului cardiac pentru prevenția primară a MSC	Numărul pacienților cărora li s-a implantat defibrilatorul cardiac pentru prevenția primară a MSC X 100.	Numărul pacienților care necesită implantul defibrilatorului cardiac pentru prevenția primară a MSC pe parcursul ultimului an.

ANEXA 1. GHIDUL PACIENTULUI CU ARITMIE VENTRICULARĂ

Generalități

Aritmiile ventriculare reprezintă o formă particulară a tulburărilor de ritm care, la rândul său, sînt o deviere de la ritmul normal al cordului.

În timpul tahiaritmii ventriculare activitatea cardiacă este caracterizată de batai rapide (tahicardie, cu frecvența între 100-250/min). Con tracția ventriculară accelerată nu permite pomparea unei cantități de sânge suficiente, ducînd la apariția unor simptome clinice, care, însă, nu sînt specifice.

Cauze și factori de risc

Pot apărea pe un cord structural normal, dar și reprezintă o complicație a unei patologii organice cardiace. Majoritatea aritmiilor ventriculare presupun un risc crescut de moarte subită, în special în contextul bolii structurale cardiace și a prezenței insuficienței cardiace, cel mai frecvent în boala cardiacă ischemică cu infarct miocardic în antecedente, necesitînd elucidarea și înlăturarea (dacă este posibil) a substratului ce o provoacă.

Mai rar tahiaritmiile ventriculare sînt rezultatul unor cardiopatii aritmogene cu substrat determinat genetic, a dezechilibrului electrolic, precum nivelul scăzut al potasiului sanguin (hipopotasemia) și apar în absența bolii coronariene sau a cardiomiopatiilor. Unele medicamente antiaritmice utilizate în tratamentul altor aritmii, medicamentele decongestionante, pastilele de slabire sau amfetaminele pot sta la baza apariției unor episoade de tahiaritmii ventriculare.

Consumul de droguri de tipul cocainei, ecstasy și amfetaminei trebuie evitat datorită potențialului proaritmie al acestora.

Simptome

Simptomatologia aritmiilor ventriculare este extrem de diversă: de la total asimptomatice, descoperindu-se la un examen de rutină, pînă la pierderea conștienței. Mai frecvent tahiaritmia ventriculară se manifestă prin palpitații sau percepția iregularității ritmului cardiac, dispnee paroxistică, durere sau disconfort precordial asociate cu senzație de slăbiciune generală, amețeală sau stare de leșin, pierderea conștienței. În cazul unor accese scurte de tahicardie ventriculară pacienții sînt asimptomatici.

Cînd presupunem prezența unei tahiaritmii ventriculare?

Putem presupune prezența unei tahiaritmii ventriculare în prezența unui episod de vertij pronunțat sau pierdere de conștiență, precedat de palpitații, fără semne premonitorii, cu revenire rapidă (în special în prezența disfuncției ventriculare stîngi, patologiei coronariene, istoricului familial de moarte subită la vîrsta tînră).

În caz de suspiciune a unei tahiaritmii ventriculare adresarea la medic este obligatorie.

În cazul apariției simptomatologiei specifice de tahiaritmie ventriculară susținută se va apela imediat serviciul de urgență.