

ANEXE

Anexa 1. Informație pentru pacient cu otita medie cronică supurată

(Ghid pentru pacienți)

Otita medie cronică supurată constituie o patologie destul de răspândită. După datele Organizației Mondiale a Sănătății 2-4% din populația globului pămîntesc suferă de patologia dată.

Prin termenul de otita medie cronică supurată – se subînțelege inflamația cronică supurată a mucoasei și a structurilor osoase ale urechii medii. Cauza patologiei este infecția care pătrunde în urechea medie (cel mai frecvent prin tuba auditivă).

Simptomele principale ale otitei medii cronice supurate sunt:

- Eliminările purulente din ureche mai mult de 2 luni
- Scăderea auzului, zgomote în ureche
- Prezența perforației (defectului) membranei timpanice

Această patologie este periculoasă prin complicațiile sale (meningita, abces cerebral). De aceea toți bolnavii cu otită medie cronică supurată trebuie să fie tratați de către medicul otorinolaringolog.

Metoda de bază de tratament a otitei medii cronice supurate este chirurgicală – sanarea infecției cronice supurate în urechea medie. Dacă în rezultatul intervenției chirurgicale eliminările purulente din ureche au dispărut, poate fi efectuată operația pentru ameliorarea auzului.

Tratamentul conservator se aplică numai în cazul cînd bolnavul are contraindicații pentru tratament chirurgical sau refuză de intervenție.

Profilaxia otitei medii cronice supurate constă în tratamentul precoce și adecvat a otitei acute medie supurate, sanarea cavității nazale și a sinusurilor paranazale, imunostimulare.